

Différence entre VIH et SIDA

Le **VIH** (**V**irus de l'**I**mmunodéficienc**e** **H**umaine) se transmet d'une personne à une autre et peut toucher tout le monde.

Il attaque lentement les défenses immunitaires qui servent à nous protéger des maladies. Sans traitement, le système immunitaire s'affaiblit et la personne peut développer des maladies. Elles peuvent être graves et entraîner la mort. On dit alors que la personne est malade du SIDA (syndrome de l'immunodéficienc**e** acquise).

| La transmission du VIH | |
|--|---|
| Modes de transmission : <ul style="list-style-type: none">✓ Rapport sexuel non protégé✓ Partage de matériel de consommation de drogues ou accident d'exposition au sang✓ Transmission de la mère porteuse du VIH à l'enfant (sans traitement pendant la grossesse, l'accouchement, ou l'allaitement). | Le VIH ne se transmet jamais par : <ul style="list-style-type: none">✗ Les baisers, les caresses✗ Le contact cutané avec la cuvette des WC✗ Le don du sang✗ Les piqûres d'insectes✗ Les piercings et tatouages si le matériel utilisé est à usage unique |

Le traitement du VIH

Le **TasP** (Treatment as Prevention) signifie que les personnes séropositives lorsqu'elles prennent correctement leur traitement et que la charge virale est dite « indétectable » depuis plus de 6 mois, ne peuvent plus transmettre le virus à leur partenaire. Des traitements à action prolongée par voie injectable ont vu le jour, ce qui améliore la qualité de vie des patients. Ils sont accessibles sous certaines conditions.

Le dépistage du VIH


Quand ?

A n'importe quel âge et à chaque prise de risque.



Par prise de sang :

- Dès 6 semaines après un risque : rapport sexuel non protégé, le préservatif s'est déchiré, partage de matériel d'injection ou de sniff lors d'un usage de drogues.
- Si l'on souhaite arrêter l'usage du préservatif
- C'est gratuit, sans prescription, dans les laboratoires (avec une couverture sociale)



Par TROD (Test Rapide d'Orientation et de Diagnostique) : fiable 3 mois après une pratique à risque. Réalisé avec une goutte de sang.

Où ?

- Dans un CEGGID (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic des infections Sexuellement Transmissibles) à l'hôpital de Bel Air ou Mercy.
- Dans un laboratoire d'analyses médicales (gratuit et sans ordonnance avec une carte vitale à jour)
- Dans une association (AIDES, Centre de planification ou d'éducation familiale, CSAPA Baudelaire, etc.)

La PREP est un traitement préventif pour éviter l'infection au VIH. Il s'adresse à toutes les personnes de plus de 15ans et peut être prescrit par ton médecin traitant ou gratuitement dans un CEGIDD. En respectant la prise du traitement tu te protèges efficacement contre le VIH.

Le PRESERVATIF interne ou externe est le moyen le plus efficace contre le VIH et les IST, bien lubrifié il évite le risque de déchirement. Il est gratuit en pharmacie pour les moins de 26ans. Tu peux aussi en avoir gratuitement auprès des associations, de l'infirmière scolaire et en prescription chez ton médecin.



La STERIBOX ou KIT EXPERT contient 2 seringues et du matériel d'injection stérile à usage unique et personnel. A ne pas partager. En vente libre en pharmacie et gratuit dans certaines associations comme Aides.

Le TPE (traitement post exposition) est prescrit aux urgences et doit être commencé dans les 48h après une prise de risque. Ce traitement de 28 jours empêche l'infection au VIH.

Association AIDES : 06 35 50 04 50 Permanence mardi 3 rue du cygne à Thionville de 16h à 19h

SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800 appel anonyme et gratuit 24h/24

FILS SANTE JEUNE : 0 800 235 236 appel anonyme 9h-23h

CSAPA Baudelaire : 03 82 59 29 73 Le centre de soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

CEGIDD BEL : AIR 03 82 55 51 83

Centre de Planification ou d'Education Familial : 03 87 35 01 70

PASS : 03 82 88 15 03 Permanence médicale et Sociale pour toutes personnes en difficultés

aides.org

sexosafe.fr

jemedepiste.com

